

# Recomendaciones generales en intervenciones de TRDs



## 1. Cuestionario durante intervención telefónica:

### a) En los últimos 14 días...

- ¿Ha estado usted en una zona contaminada con COVID-19?
- ¿Ha estado usted con alguna persona que haya estado en una zona contaminada?
- ¿Ha estado usted con alguna persona diagnosticada de COVID-19?

## 2. b) ¿Tiene Ud. hoy fiebre, tos o sensación de falta de aire?

### En caso sospecha o confirmación COVID-19 positivo:

- Registrar en el sistema informático con atributo específico y anónimo.

### Intentar resolver cualquier intervención de forma remota.

### Sólo cuando haya que intervenir:

- Contactar previamente por teléfono para acordar las indicaciones.
- Preparar previamente todo el material necesario antes de la visita.
- Si se precisa entregar un equipo, programarlo previamente de acuerdo a la prescripción y probar funcionamiento en el vehículo, para ello emplear convertidor DC/AC 12V.
- Lleve consigo sólo el material necesario para la intervención en el domicilio del paciente.
- Antes de la intervención, solicitar al paciente y cuidador que permanezcan en una habitación diferente de la que se realiza la intervención y/o lleven mascarilla quirúrgica.
- Deje una distancia preventiva de 2 metros entre el paciente / familia y usted.
- No tocar nada en la casa del paciente y en la medida de lo posible, no tocar al paciente ni a su cuidador.
- Evitar tocarse la cara durante el procedimiento.
- La PDA debe mantenerse en todo momento en el bolsillo o en la mano, evitando que toque superficies del domicilio.
- Use su propio bolígrafo y evite ponerlo sobre cualquier superficie en casa del paciente (mesas, muebles, suelo,...).
- No intercambie documentos en papel ni autorizaciones GDPR firmadas.
- No recoger consumibles.
- Realizar la visita en el menor tiempo posible para minimizar riesgos.
- Lavarse o desinfectarse las manos antes y después de cada intervención.

Recomendaciones basadas en las indicaciones de SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) y la Sociedad Francesa de Neumología (SPLF) sobre el uso de las terapias respiratorias en el marco de la epidemia de COVID-19.

Comprometidos con la mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes respiratorios crónicos

